SABES QUE ES LA HIPOACUSIA?

| 15-07-2021 | SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE MANIZALES



FUENTE: Consejos de tu farmaceutico

La hipoacusia, sordera o disminución auditiva: es la dificultad o imposibilidad para usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (Cofósis), ser unilateral o bilateral.

La pérdida de audición es la discapacidad sensorial de mayor prevalencia. La OMS ha hecho estimaciones que sirven de base para conocer el número y porcentaje de personas con pérdida auditiva por tipo, grado, etiología y costos aproximados sobre la discapacidad. Más del 5% de la población mundial (360 millones de personas) padece pérdida de audición discapacitante (328 millones de adultos y 32 millones de niños).

Se entiende por pérdida auditiva discapacitante aquellas que tienen grados superiores a 30 dB en el mejor oído, tanto en niños como en adultos.

La mayoría de las personas con pérdida de audición discapacitante vive en países de bajos y medianos ingresos.

PRINCIPALES CAUSAS DE LA PERDIDA AUDITIVA:

ACCIDENTE:

1.trauma craneo encefalico y trauma de oido

2.exposición a ruidos excesivos y contaminación sonora

3.uso de sustancias y medicamentos ototóxicos

4.cerumen impactado o encajamiento de cuerpos extraños

ENFERMEDAD

2.Infecciones como: a) enfermedades infecciosas y cronicas del oido.
b) rubeóla, sarampión, parotiditis, , meningitis y toxoplasmosis
c)bajo peso al nacer, incompatibilidad sanguinea, hipoxia neonatal, sufrimiento fetal

EDAD

Presbiacusia (pérdida auditiva durante el envejecimiento)

¿A quiénes afecta la pérdida de la audición?

A todas las personas, en todas las edades.

SIGNOS DE PERDIDA DE LA AUDICIÓN

- oye bien la mayor parte del tiempo, pero en otras ocasiones no responde.
- quiere subir el volumen de la televisión más que los demás miembros de la familia.
- dice: "¿qué?" con demasiada frecuencia
- dirige uno de sus oídos hacia delante para escuchar, o se queja de que solo puede oír con su oído bueno.
- se queja de que no escucha.
- parece que no presta atención
- baja su rendimiento en las actividades se da cuenta de que no escucha, ni responde como los demás.
- comienza a hablar más alto que antes.
- mira con intensidad cuando usted habla, como si estuviera concentrado, lo que puede indicar que está pendiente de signos visuales para interpretar el habla.

Las estimaciones de la OMS en el 2016 sobre las perdidas auditivas prevenibles son: un 40% no prevenibles, 60% prevenibles (8% de otras causas – abarca las malformaciones congénitas, no genéticas y otras causas prenatales de origen materno), (4% por medicamentos ototóxicos), 31% debido a enfermedades infecciosas (paperas, rubeola, meningitis, sarampión e infecciones de oído) y un 17 % por causas relacionadas con el nacimiento (complicaciones del parto, prematuridad y bajo peso al nacer)

En Colombia la morbilidad de las enfermedades del oído, trastornos de la audición y comunicación tienen una fuerte relación con la posición socioeconómica desfavorable y el nivel educativo bajo, que aumentan con la edad y sexo por tipo de enfermedad, siendo más frecuente en algunos casos en las mujeres que en los hombre por ejemplo: las hipoacusias. También son predominantes en la población habitante de centros urbanos, aunque la tendencia en áreas urbanas y rurales va en aumento.

LO QUE NO SE DEBE HACER

LO QUE SI SE PUEDE HACER

SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

"Somos todo oídos"